



ĮMONĖS KOKYBĖS STANDARTAS

Gliceriniui, gautam iš rapso aliejaus esterifikacijos glicerino fazės, taikomi
KOKYBĖS RODIKLIAI IR JŲ TYRIMŲ METODAI

Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė) - **Skystis.**

Juslinės savybės (spalva, kvapas) - **Rusvos spalvos, sirupo tipo skystis, švelnaus aliejaus kvapo.**

Tirpumas (vandenyje) - **Gerai tirpsta vandenyje.**

Eil. Nr.	Kokybės rodikliai	Vienetai	Tyrimo metodas	Faktas
1	Glicerino kiekis	% masės	GOST 7482-96	70-78
2	Peleningumas	% masės	IUPAC 0033-4545/80/0701-1939\$02.00/0	5 – 15,0
3	MONG	% masės	IUPAC 0033-4545/80/0701-1939\$02.00/0	2 – 10,0
4	Vandens kiekis	% masės	LST EN ISO 12937	5 – 10,0
5	Metanolio kiekis	% masės	LST EN ISO 14110	0 – 0,2
6	Tankis, esant 20°C	kg/m ³	LST EN ISO 3675	1290 – 1360
7	pH		-	4,5 – 5,5
8	Glicerino reakcija	mekv/100 g	IUPAC 0033-4545/80/0701-1939\$02.00/0	nustatomas

RAPSOLA